





Partner di progetto:



Enti gestori di SIC lombardi coinvolti:




Collaborazione scientifica



Le attività ERSAF nei centri di allevamento del gambero di fiume

I nati durante il progetto (2010-2014)

ALLEVAMENTO	PICCOLI NATI	FEMMINE	MASCHI
 TIGNALE (BS)	2598	1412	1186
 CANZO (CO)	1867	1066	801
TOTALE	4465	2478	1987



- C1 Parco Campo dei Fiori
- C2 Parco di Montevicchia e Valle del Curone
- C3 Riserva Naturale Sasso Malascarpa
- T1 Parco Alto Garda Bresciano
- T2 Parco dei Colli di Bergamo
- T3 Riserva Naturale Funtani

LA LETTERA EVIDENZIA L'ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (C = CANZO; T = TIGNALE)

  Allevamenti

Cattura notturna dei riproduttori sui torrenti.
Misurazione, numerazione e introduzione negli stagni.

ACCOPIAMENTO

Controlli periodici

Liberazione adulti maschi

Liberazione adulti femmine

NASCITE

Svuotamento delle vasche per la raccolta dei piccoli nati e la semina nei torrenti scelti

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Nei centri riproduttivi, per attivare un nuovo ciclo riproduttivo, vengono preparati gli stagni immergendo mattoni forati che fungeranno da rifugio, insieme ad alcune ramaglie e fogliame.






I gamberi adulti vengono catturati di notte nei torrenti, vengono subito misurati, pesati, numerati e introdotti negli stagni.

In queste vasche i gamberi potranno così iniziare indisturbati il loro ciclo riproduttivo.




Nel tardo autunno e in inverno le attività sono ridotte al minimo: si introduce un poco di cibo e si tolgono e poi si rimettono le reti di protezione contro la deposizione delle libellule, le cui larve in estate si nutrono dei piccoli gamberi.

Nel frattempo le femmine, sotto l'addome, custodiscono le uova che si apriranno tra giugno e luglio.



È il periodo di maggiore attività e i controlli periodici diventano più frequenti: viene monitorata la qualità dell'acqua, la salute dei gamberi adulti e delle uova e più tardi quella dei piccoli gamberi.

Per evitare che gli adulti arrechino danno ai piccoli, a maggio i maschi vengono raccolti e riportati nei torrenti, mentre per le femmine si aspetta fino a luglio, quando i piccoli dopo alcune mute diventano indipendenti. I piccoli gamberi, muta dopo muta, continuano così a crescere senza essere disturbati.



A settembre il ciclo produttivo si chiude. I piccoli nati sono pronti per andare a ripopolare i torrenti: gli stagni vengono svuotati, i piccoli vengono raccolti uno ad uno, viene riconosciuto il sesso, vengono misurati e pesati. Sono pronti per essere liberati nei torrenti e, dopo 4 anni se saranno sopravvissuti, diventeranno adulti e si riprodurranno in natura, ripopolando i torrenti che li ospitano.



www.lifecrainat.eu

Cerca nel web / search on the web:
"CRAINat - Il Gambero di fiume" libretto informativo
"CRAINat - The white-clawed crayfish" information booklet